

| | |
|------------|---------------|
| ثلاث ساعات | مدة الإنجاز : |
| 1 | المعامل |

| | |
|--|--------|
| اختبار في ديداكتيك مادة التخصص : الرياضيات | المادة |
|--|--------|

www.educaprof.com

تعليمات عامة

يتكون اختبار ديداكتيك مادة الرياضيات من ثلاثة مواضيع مستقلة فيما بينها في 5 صفحات الأولى منها خاصة بالتعليمات التالية:

1. يرجى من المترشح (ة) الإجابة عن أسئلة الاختبار بما تستحقه من دقة وعناية.
2. لا يسمح باستعمال الآلة الحاسبة كيما كان نوعها.
3. لا يسمح باستعمال أي وثيقة خارج نص الاختبار.
4. يراعى عند التصحيح حسن تقديم ورقة التحرير والكتابة بخط واضح ومقروء.
5. يمكن للمترشح (ة) إنجاز أسئلة الاختبار حسب الترتيب الذي يناسبه شريطة الإشارة إلى رقم السؤال وموقعه في الموضوع.

مكونات الاختبار

| | |
|----------------|--------|
| الموضوع الأول | 10 نقط |
| الموضوع الثاني | 3 نقط |
| الموضوع الثالث | 7 نقط |



الموضوع الأول: (10 نقط)

نفترض عليك الوثيقة التالية (وثيقة 1) المكونة من سلسلة تمارين اقترحتها أستاذ على تلاميذ الجذع المشترك العلمي:

الوثيقة 1

Equations, inéquations et systèmes

Ex01 : Soit a et b deux entiers naturels.
Résoudre et discuter dans \mathbb{N} l'équation :

$$\frac{a}{x-b} + \frac{b}{x-a} = 2$$

Ex02 :
Résoudre dans \mathbb{R} les équations :

1) $x^2 - 2x - 2|x-1| - 2 = 0$

2) $x^2 + x + 2\sqrt{x^2 + x + 2} - 6 = 0$

Ex03 :
Soient S et T les ensembles des solutions, dans \mathbb{R} , respectifs des équations :

$$x^2 + x + p = 0 \quad \text{et} \quad x^2 + qx - 3 = 0$$

Déterminer les valeurs de p et q sachant que : $S \cup T = \{-2; -1; 1; 3\}$.

Ex04 : Déterminer les valeurs du paramètre réel m pour que l'équation d'inconnue x :
 $(m-2)x^2 - (m-4)x + m - 3 = 0$
 ait deux solutions α et β telles que :
 $\alpha < 1 < \beta$

Ex05 :

1) Montrer que, pour tout nombre réel m , l'équation : $x^2 - m(m-2)x - (m-1)^2 = 0$. admet deux solutions distinctes α et β .

2) Déterminer les valeurs de m pour que :

$$2\sqrt{\alpha + \beta - 2(m-2)} - 3\sqrt{-\alpha\beta} \geq 1$$

Ex06 :

1) Résoudre dans \mathbb{R} l'inéquation :

$$|x^2 - 5x + 7| \leq 1.$$

2) Résoudre dans \mathbb{R}^2 le système :

$$\begin{cases} \frac{2}{x} + 3\sqrt{y} = 8 \\ \frac{3}{x} - 5\sqrt{y} = -7 \end{cases}$$

- ✓ 1. (a) حدد (ي) موقع هذا الدرس في التوزيع الدوري الرسمي.
 ✓ (b) حسب مذكرة المراقبة المستمرة -08-142 الصادرة بتاريخ 16 نوفمبر 2007 تحت موضوع : التقويم التربوي بالسلك الثانوي التأهيلي لمادة الرياضيات، ما هو الرقم التسلسلي للفرض المحسوس الذي يندرج في هذا الدرس كمكون؟
- ✓ 2. ماهي القدرات المنتظرة من هذا الدرس؟
 ✓ 3. (a) أعط تعريفاً لمفهوم المهارة في المجال التربوي.
 ✓ (b) حدد (ي) مهارة واحدة يتطلبها إنجاز كل من التمارين المرقمن بـ 01 و 03.
- ✓ 4. سنركز في هذا السؤال على التمرين رقم 02 الوارد في الوثيقة 1.
 ✓ (a) اقترح (ي) طريقتين لحل هذا التمرين.
 ✓ (b) ما هي المكتسبات القبلية الضرورية لإنجاز هذا التمرين؟
 ✓ (c) حدد (ي) صعوبتين متوقعتين لدى التلاميذ أثناء إنجاز هذا التمرين.
- ✓ 5. هل يمكن اقتراح التمرين رقم 05 كنشاط تقويمي في كل حالة من الحالات التالية؟ علل جوابك.
 ✓ (a) فرض محروس؟
 ✓ (b) فرض منزلي؟

(6) يعتبر محمد بن موسى الخوارزمي (781م - 847م) من أبرز علماء الرياضيات المسلمين و ساهم بشكل فعال في حل المعادلات من الدرجة الثانية بمجهول واحد. جاء في مؤلفه "الجبر والمقابلة" ما يلي:

الوثيقة 2

المقتطف الأول: "ووجدت الأعداد التي يحتاج إليها في حساب الجبر و المقابلة على ثلاثة ضروب و هي جذور وأموال و عدد مفرد لا يناسب إلى جذر ولا إلى مال . فالجذر منها كل شيء مضروب في نفسه من الواحد وما فوقه من الأعداد وما دونه من الكسور ، والمال كل ما اجتمع من الجذر المضروب في نفسه . والعدد المفرد كل ملفوظ به من العدد بلا نسبة إلى جذر ولا إلى مال" ص 16 وص 17

المقتطف الثاني: "فاما الأموال والجذور التي تعدل العدد فمثل قوله مال و عشرة أحذاره بعدل تسعة وثلاثين درهما و معناه أي مال إذا زدت عليه مثل عشرة أحذاره بلغ ذلك تسعة وثلاثين ، فبایه أن تنصف الأحذار وهي في هذه المسألة خمسة فتضربها في مثلها فتكون خمسة وعشرين فتزيدوها على التسعة والثلاثين تكون أربعة وستين فتأخذ جذرها وهو ثمانية فتنقص منه نصف الأحذار وهو خمسة فيبقى ثلاثة وهو جذر المال الذي تريده المال تسعة" ص 18 وص 19.

المصدر: كتاب الجبر والمقابلة لمحمد بن موسى الخوارزمي، تقديم وتعليق: د. علي مصطفى مشرفة و د. محمد مرسي أحمد، مطبعة بول باربيه 1937.

بعد قراءتك للوثيقة 2 أجب عن الأسئلة التالية:

- اعط صياغة جديدة باستعمال الترميز الحالي للمعادلة الواردة في المقتطف الثاني.
- حدد (ي) الطريقة التي اعتمدها الخوارزمي في حل المعادلة موضوع السؤال (6)
- حدد (ي) أدلة أساسية وظفتها الخوارزمي في صياغة هذا الحل.
- ما هي حدود الطريقة التي اعتمدها الخوارزمي في حل المعادلة؟
- أعد (ي) بلغة الخوارزمي صياغة المعادلة: $3x + 4 = x^2$.

الموضوع الثاني: (3 نقط)

وأصل أستاذ مادة الرياضيات تقديم فقرة الاستدلالات الرياضية من درس مبادئ في المنطق لقسم من مستوى الأولى علوم تجريبية، وذلك بالطرق إلى الاستدلال بالخلاف. بدأ الأستاذ بإعطاء الخاصية التي ينبغي عليها الاستدلال بالخلاف:

خاصية: لكل عبارتين P و Q لدينا العبارة: $P \Rightarrow Q$ $\left[\left(\bar{P} \Rightarrow \bar{Q} \right) \Rightarrow P \right]$ قانون منطقى.

عقب ذلك قدم الأستاذ التمرين التطبيقي التالي:

. $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ بين باستعمال الاستدلال بالخلاف أن:

قلم الأستاذ بتحرير الجواب على السبورة كما يلى:

نفترض أن $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ إذن: $\frac{a}{b} = \sqrt{2}$ حيث أن a و b أوليان فيما بينهما.

$$\text{ومنه: } a^2 = 2b^2$$

نستنتج من المتساوية (*) أن a^2 عدد زوجي إذن a عدد زوجي. وهذا يعني أن:

وبالتعويض في (*), نحصل على: $4k^2 = 2b^2$ أي: $2k^2 = b^2$. إذن b^2 زوجي ومنه: b زوجي.

وبالتالي العدد 2 قاسم مشترك لكل من a و b وهذا تناقض.

تساءل أحد التلاميذ عن غياب العبارتين P و Q في جواب الأستاذ فسأله: "أين P و Q يا أستاذ؟" وكان جواب الأستاذ: "نقوم عادة بالبرهان بالخلف بهذه الطريقة والمهم لدينا هو إيجاد التناقض".

الأسئلة الموجهة للمترشح (٥):

- ✓ 1) اذكر (ي) باقي الاستدلالات الرياضية المقررة في درس مبادئ في المنطق.
 - 2) ماهي المبادئ التي يعتمد عليها الاستدلال بالخلف؟
 - 3) حدد(ي) العبارتين P و Q المعبر عنهما في الخاصية والتي لم يتطرق إليها الأستاذ في جوابه عن التمرين.
 - 4) حدد(ي) ثلاثة مشاكل ديداكتيكية يطرحها تدريس الاستدلال بالخلف.
 - 5) ماهي المرحلة التي لم يدقق فيها الأستاذ جوابه عند حله للتمرين التطبيقي؟
 - 6) تشير التوجيهات التربوية إلى أن درس المنطق لا ينتهي بانتهاء هذا الفصل بل ينبغي استثمار نتائجه، كلما سُنحت الفرصة لذلك، بمختلف فصول المقرر اللاحقة.
- اقتراح(ي) وضعية محلولة في كل من الدرسين التاليين يتم فيهما توظيف الاستدلال بالخلف:
- المتاليات العددية.
 - الهندسة الفضائية.
- 7) اقتراح وضعية محلولة يتطلب إنجازها اعتماد طريقتين مختلفتين:
- طريقة أولى بتوظيف الاستدلال بالخلف.
 - طريقة ثانية بتوظيف الاستدلال المضاد للعكس.

الموضوع الثالث: (٧ نقط)

اقترحت أستاذة مادة الرياضيات على تلامذتها في قسم من مستوى السنة الثانية بكالوريا شعبة العلوم التجريبية، مسلك علوم فيزيائية، التمرين التالي:

التمرين: يحتوي كيس على كرتين حمراوين وثلاث كرات خضراء وأربع كرات بيضاء لا يمكن التمييز بينها

باللمس. نسحب بالتتابع وبدون إحلال ثلات كرات من هذا الكيس.

ليكن X المتغير العشوائي الذي يربط كل سحبة بعدد الكرات البيضاء المسحوبة.

أحسب: $P(X = 2)$.

جاءت أجوبة ثلاثة تلاميذ على الشكل التالي:

| جواب التلميذ محمد | جواب التلميذ أحمد | جواب التلميذة أمال |
|---|--|--|
| ت تكون التجربة من إعادة الاختبار ثلاث مرات متالية، احتمال سحب كرة بيضاء في اختبار واحد هو $\frac{4}{9}$. | الحدث ($X = 2$) يعني نسحب بالتتابع وبدون إحلال كرتين بيضاوين وكمة غير بيضاء. ومنه: | الحدث ($X = 2$) يعني الحصول على كرتين بيضاوين بالضبط من بين الكرات الثلاث المسحوبة. ومنه: |
| ومنه X متغير عشوائي حداني وسيطاه $\frac{4}{9}$. ومنه: | $P(X = 2) = \frac{A_4^2 \times A_5^1}{A_9^3}$ $= \frac{12 \times 5}{504}$ $= \frac{5}{42}$ | $P(X = 2) = \frac{3 \times A_4^2 \times A_5^1}{A_9^3}$ $= \frac{3 \times 12 \times 5}{504}$ $= \frac{5}{14}$ |
| $P(X = 2) = C_3^2 \times \left(\frac{4}{9}\right)^2 \times \left(\frac{5}{9}\right)$ | | |



✓ 1) حل أجبة التلاميذ الثلاثة مستعيناً بالجدول التالي:

| التعليق | جواب خطأ | جواب صحيح | |
|---------|----------|-----------|---------------|
| | | ✓ | الתלמידة أمال |
| . | | ✓ | الתלמיד أحمد |
| | ✓ | | الתלמיד محمد |

- ✓ 2) ما هي مصادر الأخطاء التي رصدتها في أجبة التلاميذ؟ علل (ي) جوابك.
- ✓ 3) اقترح (ي) وضعية داعمة ارتباطاً بكل خطأ مرصد.
- ✓ 4) ما هي التعديلات التي يمكن إدخالها على معطيات نص التمرين لكي يصبح المتغير العشوائي X حدانياً وسيطاه 4 و $\frac{4}{9}$.
- ✓ 5) يطرح تقديم درس الاحتمالات عدة صعوبات، حدد ثلاثة منها معللاً جوابك.
- 6) تشير التوجيهات التربوية إلى إدراج مفهوم المحاكاة (Simulation) في حساب الاحتمالات.
- (a) ما المقصود بمفهوم المحاكاة؟ ✓
- (b) اذكر (ي) ثلات دوال (Fonctions) للمبرمج Excel تسمح بمحاكاة تجربة عشوائية.